

IPN

*Terapias en el hogar
Lista de recordatorios
para el paciente*

Con el objetivo de incrementar la cantidad de proteína que recibe, su médico y dietista renal han añadido la nutrición intraperitoneal (IPN, por sus siglas en inglés) a su tratamiento de diálisis. Pentec Health le enviará las bolsas de IPN semanalmente. Preparamos el tratamiento de IPN específicamente para usted y sus necesidades, basándonos en la prescripción de su médico. Esta es una lista de verificación útil sobre lo que debe hacer y a qué prestar atención al empezar a recibir las bolsas de IPN.

Cómo manipular la bolsa al recibirla:

- ❑ Inspeccione las bolsas de IPN inmediatamente para asegurarse de que no estén calientes, congeladas, no tengan filtraciones, turbidez ni decoloración.
- ❑ Coloque las bolsas de IPN en el refrigerador de medicamentos de Pentec Health, asegurándose de que la temperatura se mantenga entre 36 y 46 grados Fahrenheit (2,2 y 7,8 grados Celsius).
- ❑ Una vez que reciba un envío, rote las bolsas de IPN para asegurarse de usar primero las más antiguas. En la etiqueta del envase farmacéutico de las bolsas de IPN se indica la fecha de caducidad en la parte inferior. Verifique esta fecha.

Cómo manipular la bolsa antes de la infusión:

- ❑ Inspeccione la bolsa de IPN después de sacarla del refrigerador y antes de la infusión para asegurarse de que no haya decoloración, turbidez ni partículas.
- ❑ Verifique la fecha de caducidad: la fecha de caducidad se indica en la parte inferior de la etiqueta de la bolsa. Se debe chequear esta fecha antes la infusión. Si la bolsa ha caducado, debe drenarla y desecharla.
- ❑ Temperatura ambiente. Retire las bolsas de IPN del refrigerador 1 hora antes de la infusión. Nunca use las bolsas directamente del refrigerador. Puede mantener la bolsa de IPN fuera del refrigerador hasta 24 horas antes de realizar la infusión.

No caliente la bolsa de IPN en el microondas ni la coloque en un baño maría.

Cómo usar la bolsa:

- ❑ Revise la etiqueta de su bolsa de IPN para consultar las instrucciones específicas sobre la infusión. Normalmente, la bolsa de IPN es la primera bolsa en la máquina cíclica o se cuelga para reemplazar un intercambio.
- ❑ Siga las instrucciones para iniciar el tratamiento de nutrición intraperitoneal según lo indicado por su proveedor.
- ❑ Esté atento a los signos de deshidratación y llame a su proveedor si tiene algún problema.

Si necesita suspender sus envíos de IPN o tiene alguna pregunta o inquietud, **llame a Pentec Health al 800-223-4376.**

Almacenamiento de envíos de IPN

El refrigerador que se le proporcionó tiene capacidad para siete bolsas de dializado de IPN. Retire cada estante del refrigerador. El cajón inferior permanecerá en el refrigerador. *(Imagen 1)*

Siga el procedimiento que se detalla a continuación para cada entrega semanal.

Abra cada caja y retire el IPN. Cada bolsa viene envuelta en plástico de burbujas para protegerla durante el envío. Retire este plástico de burbujas e inspeccione cada bolsa en busca de signos de filtraciones o daños.

Si tiene alguna pregunta sobre la integridad de la bolsa o la solución, póngase en contacto con Pentec Health, Inc. (800-223-4376) para obtener un reemplazo.

Si le queda una bolsa de la entrega anterior, retírela en este momento del refrigerador para su próxima sesión de tratamiento.

Coloque 2 bolsas en el cajón *(Imagen 2)*

Coloque 2 bolsas de adelante a atrás *(Imagen 3)*

Coloque otras 2 bolsas encima *(Imagen 4)*

Coloque la última bolsa encima *(Imagen 5)*

Asegúrese de que la puerta del refrigerador cierre.



(Imagen 1)



(Imagen 2)



(Imagen 3)



(Imagen 4)



(Imagen 5)